

Số: /HD-UBND

Đồng Liên, ngày tháng 01 năm 2024

HƯỚNG DẪN

Phòng chống rét cho cây trồng vụ Xuân và phòng trừ dịch bệnh trên một số cây trồng chính dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, nền nhiệt giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 - 10⁰C, vùng núi Bắc Bộ từ 3 - 6 độ C, thời tiết rét đậm, rét hại.

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy: Hiện nay, cây lúa Xuân đang giai đoạn mạ - cấy - hồi xanh; cây chè giai đoạn đốn, một số diện tích sản xuất chè đông đang giai đoạn phát triển búp; cây rau họ hoa thập tự giai đoạn phát triển thân lá, cà chua, khoai tây phát triển củ, quả.

Căn cứ Công văn số 01/HD-TTĐVNN ngày 22/01/2024 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Thái Nguyên về việc Phòng chống rét cho cây trồng vụ Xuân và phòng trừ dịch bệnh trên một số cây trồng chính dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

Căn cứ tình hình thời tiết và sinh trưởng cây trồng. Để hạn chế ảnh hưởng do điều kiện thời tiết bất thuận và thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, UBND xã Đồng Liên hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng vụ Xuân năm 2024 và chủ động phòng trừ các đối tượng dịch hại trên cây trồng như sau:

1. Cây lúa

Đối với mạ Xuân:

- Tuyệt đối không gieo mạ những ngày nhiệt độ dưới 15⁰C.

- Đối với những ruộng mạ mới gieo phải làm khung vòm phủ kín bằng nilon trắng cho mạ; Luôn giữ ẩm cho mạ bằng cách giữ nước ở rãnh, tuyệt đối không để mạ bị khô hạn. Rắc tro bếp lên trên mặt luống để giữ ẩm cho mạ.

- Khi nhiệt độ trên 15⁰C: Tiến hành gieo đối với thóc giống đã ngâm ủ nảy mầm. Sau gieo cần che kín nilon trắng để giữ ẩm và ẩm tạo điều kiện cho mạ nhanh mọc. Khi mạ được 1 lá thật, thường xuyên giữ đủ ẩm; tiến hành mở dần nilon 2 đầu luống mạ, tuyệt đối không bón phân đạm, NPK cho mạ. Trước cây 2 - 3 ngày phải mở hết nilon để mạ được thích nghi với môi trường tự nhiên, cấy khi mạ đạt 3-3,5 lá.

Cần dự phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để sẵn sàng gieo cấy bổ sung cho những diện tích mạ, lúa mới cấy chết rết.

- Thường xuyên kiểm tra bệnh đạo ôn trên ruộng mạ, lúa, phun phòng bệnh khi gặp điều kiện thời tiết âm u, độ ẩm cao, rét nhẹ. Khi phát hiện bệnh cần tiến hành phun thuốc trừ bệnh trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Amistar Top® 325SC; Daconil 75WP; Fuji-One 40EC, 40WP, Katana 20SC ...

2. Cây chè

Chú ý theo dõi phát hiện sớm bệnh phòng lá xuất hiện gây hại:

- Với chè vườn ươm: Vệ sinh vườn sạch sẽ, bón phân cân đối, điều chỉnh mái che thông thoáng trong vườn ươm.

- Với chè kinh doanh: Thực hiện bón phân cân đối, dừng bón phân khi bệnh xuất hiện.

- Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Manage 5WP, Stifano 5.5SL, Starsuper 20WP...

3. Cây rau họ hoa thập tự, cà chua, khoai tây

Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch ngay. Đối với nhóm rau ăn lá cần che bằng nilon trắng để tránh mưa rét.

Tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cây trong những ngày rét đậm. Bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm, phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét. Theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng để có biện pháp phòng chống kịp thời các đối tượng sau:

** Sâu xanh bướm trắng, sâu tơ*

Chủ động kiểm tra mật độ sâu để phòng trừ khi mật độ sâu xanh trên 6 con/m², mật độ sâu tơ trên 20 con/m², phun khi sâu tuổi nhỏ. Sử dụng các loại thuốc trừ sâu được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Aremec 45EC; Catex 3.6EC; BP Dy Gan 5.4EC; Fimex 36EC...

** Bệnh thối nhũn*

Phát hiện sớm và nhổ bỏ cây bị bệnh ra khỏi vùng trồng rau, ngừng bón phân. Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Agrilife 100SL; Stifano 5.5SL ...

** Với bệnh sương mai cà chua, khoai tây*

Chủ động phun phòng bệnh khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển (trời âm u, mưa ẩm). Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Daconil 75WP, 500SC; Amistar® 250 SC; Newtracon 70 WP ...

Chú ý: + Sử dụng thuốc BVTV phải đảm bảo thời gian cách ly.

+ Nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

4. Đối với ngô xuân: Không gieo trồng khi nhiệt độ thấp dưới 15⁰C kéo dài cho dù thời vụ gieo trồng đã đến.

UBND xã Đồng Liên đề nghị các ông/bà Trưởng xóm, Công chức VHXXH thông tin, tuyên truyền để bà con nông dân biết và phòng trừ kịp thời.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- LĐ UBND xã;
- Các Trưởng xóm;
- CC VHXXH;
- Lưu: VP, ĐCXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Nho